



Typische Symptome wie z.B.:

- Tonisch/klonische Krämpfe mit Bewusstseinstäubung
- Schaum vor dem Mund
- Zungenbiss
- zwei Anfälle hintereinander ohne das Bewusstsein zu erlangen
- Anhaltender Krampfanfall länger als 5 Min.

Erwäge differierende Verdachtsdiagnosen, z.B.:

- Blutzuckerentgleisung
  - Intoxikation
  - Entzugskampf
  - Cerebrale Infektion
  - Hirndruckzeichen
  - Fieberkrampf
- Bedenke andere Ursachen

Basismaßnahmen:

Vor Verletzungen schützen, sbschirmen, Absaugbereitschaft gewährleisten

Midazolam nasal (15mg/3ml):

- Bis 50 kg KG: 1 mg/10 kg KG
  - Über 50 kg KG: 5 mg
- Falls innerhalb 4 Min. keine Wirkung: 1 x wiederholen

Cave: Unterschiedliche Midazolam-Konzentrationen! Für nasale Gabe Verwendung von 15 mg in 3 ml.

Midazolam i.v.(15mg/3ml) mit laufender VEL:

- Bis 50 kg KG: 1 mg/10 kg KG
  - Über 50 kg KG: 5 mg
- Falls innerhalb 2 Min. keine Wirkung: 1 x wiederholen

Vitalfunktionen erheben, Temperaturmessung, BZ-Messung