



Keine routinemäßige Anwendung, sondern bei schwerer Einschränkung des Patienten hinsichtlich Compliance und Aspirationsgefahr

Cave: Übelkeit und Erbrechen können Hinweise auf eine schwerwiegende Erkrankung sein!

Bedenke z.B.:

- ACS
- ICB/SAB/Meningismus
- Gastrointestinaler Infekt mit Exsiccosegefahr
- Unklares/akutes Abdomen
- ...

Basismaßnahmen:

Vitalwerte erheben, Monitoring, ggf. 12-Kanal EKG, Lagerung nach Zustand, beengende Kleidung lockern, ...

Siehe Prozessbeschreibung intravenöser Zugang

Beachte KI: Unverträglichkeit gegen den Wirkstoff, akuter Asthmaanfall, trizyklische Antidepressiva, grüner Star (Engwinkelglaukom), Nebennierentumor, Prostatahyperplasie, bekanntes Krampfleiden ...

Schläfrigkeit, Benommenheit, Schwindelgefühl, Tachykardien

Dimenhydrinat: Erwachsene 1 Ampulle langsam i.v. oder in VEL; Kinder 6-12 Jahre 1,25 mg/kg KG

Alarmierung des Rettungsdienstes „nur“ bei Übelkeit und Erbrechen bedingt immer eine Ursachenabklärung