



Cave: „simple Infektionen“ (Pneumonie, Harnwegsinfekt, Brechdurchfall, ...) können je nach Allgemeinzustand, Immunkompetenz und Körperkonstitution zu einer schwerwiegenden Sepsis führen. Präklinisch ist nicht wichtig die Sepsis zu beweisen sondern im Zweifel daran zu denken!

Typische Symptome, z.B.:

- Bewusstseinsstörungen
- Temperatur: Hypothermie <36°C oder über 38°C
- Hauterscheinungen (z.B. Petechien, Erysipel...)

Risikofaktoren:

- Alter
- Diabetes mellitus
- Dialysepflichtigkeit
- Medizinische Devices (ZVK, SPF, Trachealkanüle...)
- Immobilität

Vitalwerte erheben, Temperaturmessung, Monitoring, kritische Anamneseerhebung

qSOFA:

Atemfrequenz	>22/Min	= 1 Punkt
Systolischer Blutdruck	<100 mmHg	= 1 Punkt
Akute Vigilanzminderung	GCS<15	= 1 Punkt

Cave: Viele Andere Ursachen wie z.B.: Schock können zu einem qSOFA ≥ 2 Punkte führen. Beachte insbesondere kontraindizierte Volumengabe beim kardiogenen Schock.

Siehe Prozessbeschreibung i.v. Zugang

Volumengabe: 1.000 ml VEL oder bis zu 30 ml/kg KG

Cave: Berücksichtige insbesondere kardiale Vorerkrankungen hinsichtlich der Infusionsmenge und der Geschwindigkeit.